Laboratoires MPS Pharma

Le traitement antidotique des brûlures par acide fluorhydrique.

Flamma Gel®
Gluconate de calcium 2,5%

Description

Flamma Gel®: Gluconate de calcium 2,5% pour les premiers secours d'urgence de brûlures cutanées à l'acide fluorhydrique.

Mode d'emploi

Commencer par laver la zone contaminée à grande eau pendant au moins 1 minute. Enlever avec précaution les vêtements souillés, tout en évitant de contaminer d'autres parties du corps. Appliquer le gel Flamma Gel®: Calciumgluconate 2,5% par un massage doux sur et autour de la surface contaminée. Consulter un professionnel de la santé. Continuer à appliquer le gel en massage sur la surface brûlée pendant 15 minutes une fois la douleur soulagée ou jusqu'à l'arrivée des secours médicaux. Si les douleurs reviennent après un traitement médical, appliquer une nouvelle couche de Flamma Gel®: Calciumgluconate 2,5% sur la brûlure et consulter de nouveau un médecin sans attendre. Jeter tous les tubes ouverts de Flamma Gel®: Calciumgluconate 2,5% après traitement.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Après avoir administré les premiers secours, obtenez systématiquement une prise en charge médicale immédiate dans le cas de brûlures cutanées à l'acide fluorhydrique. Pour usage externe uniquement.

Durée de conservation: 30 mois. Conserver entre 8°C et 25°C.

Laboratoires MPS Pharma NV - P.O. Box 50 - B 8890 Moorslede
Tel. +32(0) 51 - 22 00 64 - Fax +32(0) 51 - 22 11 32
www.mpspharma.be - info@mpspharma.be